

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Egyben címke - 1 kg műanyag tartály, 10 kg papírszák

1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME

LAVET Kft. (1161 Budapest, Ottó u. 14.)

2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

Colicin 2400 por belsőleges oldathoz A.U.V.

3. HATÓ- ÉS SEGÉDANYAGOK MEGNEVEZÉSE

Hatóanyag:

Kolisztin-szulfát 100 mg/g

4. JAVALLAT(OK)

Sertés, házityúk kolisztrinre érzékeny *E. coli* és *Salmonella spp.* okozta emésztőrendszeri fertőzéseinek gyógykezelésére.

5. ELLENJAVALLATOK

Nincs.

6. MELLÉKHATÁSOK

A készítmény célállat-tolerancia vizsgálata során mellékhatásokat még háromszoros dózisban a javasolt kezelési időtartam kétszereséig történő alkalmazás során sem okozott.

7. CÉLÁLLAT FAJOK

Sertés, házityúk.

8. ADAGOLÁS ÉS AZ ALKALMAZÁS MÓDJA

Sertés: 5 mg kolisztin-szulfát/ttkg/nap, 5 napig.

Házityúk: 6 mg kolisztin-szulfát/ttkg/nap, 5 napig.

A készítményt ivóvízben oldva alkalmazzuk az alábbiak szerint:

- Sertés: 0,35-0,45 g COLICIN/liter ivóvíz/nap
<50 ttkg: 0,35 g/l
≥50 ttkg: 0,45 g/l
- Házityúk: 0,25-0,4 g COLICIN/liter ivóvíz/nap
4 hetes korig: 0,25-0,3 g/l
4 hetes kortól: 0,3-0,4 g/l

A kezelés alatt az állatok csak a gyógyszeres ivóvizet fogyaszthatják.

9. A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT

Kolisztinnel szembeni ismert túlérzékenység esetén kerülni kell a készítménnyel való érintkezést.

Az állatgyógyászati készítmény előkészítése, alkalmazása során az alábbi egyéni védőfelszerelés viselése kötelező: védőruházat, gumikesztyű, porálarc és védőszemüveg.

10. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Sertés, házityúk ehető szövetek: 2 nap.

Tojás: 0 nap.

11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Gyermekek elől gondosan el kell zárni.

25 °C alatt, száraz helyen tárolandó.

Csak a címkén feltüntetett lejárati időn (EXP) belül szabad felhasználni!

A közvetlen csomagolás első felbontása után felhasználható 3 hónapig.

Az előírás szerinti feloldás után felhasználható 24 órán át.

12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)

Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések

Kolisztinnel szembeni ismert túlérzékenység esetén kerülni kell a készítménnyel való érintkezést.

Az állatgyógyászati készítmény előkészítése, alkalmazása során az alábbi egyéni védőfelszerelés viselése kötelező: védőruházat, gumikesztyű, porálarc és védőszemüveg.



Vemhesség, laktáció és tojásrakás idején történő alkalmazás

Az állatgyógyászati készítmény ártalmatlansága nem igazolt vemhesség és laktáció idején.

Kizárólag a kezelést végző állatorvos által elvégzett előny/kockázat elemzésnek megfelelően alkalmazható.

Tojásrakás idején alkalmazható.

Az egereken, patkányokon és nyulakon végzett laboratóriumi vizsgálatok szerint a készítmény nem rendelkezik bizonyított teratogén, főtotoxikus, maternotoxikus hatással.

Gyógyszerköölcsönhatások és egyéb interakciók

A készítmény cefalosporinokkal nem adható együtt.

Inkompatibilitások

Kompatibilitási vizsgálatok hiányában ezt az állatgyógyászati készítményt tilos keverni más állatgyógyászati készítménnyel.

13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKAINAK KEZELÉSÉRE, MEGSEMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK, (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)

A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint a keletkező hulladékokat a helyi követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.

14. HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA

2009. június 30.

15. „KIZÁRÓLAG ÁLLATGYÓGYÁSZATI ALKALMAZÁSRA” SZAVAK ÉS A KIADHATÓSÁGRA ÉS FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK ÉS KORLÁTOZÁSOK, amennyiben alkalmazható

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra!

Kizárólag állatorvosi rendelvényre adható ki.

Az állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

16. KISZERELÉSI EGYSÉGEK

1 kg

10 kg

17. TÖRZSKÖNYVI SZÁM

2569/1/09 MgSzH ÁTI (1 kg)

2569/2/09 MgSzH ÁTI (10 kg)

18. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA / LEJÁRATI IDŐ

Gyártási szám: {szám}

Felhasználható: {hónap/év}

